ЛП-№(008870)-(РГ-RU) от 17.07.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.07.2026 № 13289
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0011)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Глиатилин, 1000мг/4мл, раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Действующее вещество: холина альфосцерат

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Глиатилин, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед применением препарата Глиатилин.

3. Применение препарата Глиатилин.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Глиатилин.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Глиатилин, и для чего его применяют

Препарат Глиатилин содержит действующее вещество холина альфосцерат. Фармакотерапевтическая группа: другие препараты для лечения заболеваний нервной системы; парасимпатомиметики; другие парасимпатомиметики. Парасимпатомиметики стимулируют функции парасимпатической системы мозга и применяются для лечения заболеваний нервной системы. Благодаря этому препарат Глиатилин применяется при состояниях, когда требуется восстановление функций головного мозга.

Показания к применению
Препарат Глиатилин показан взрослым в возрасте от 18 лет:

- Нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу (острый и восстановительный период) и геморрагическому типу (восстановительный период).

- Психоорганический синдром на фоне инволюционных и дегенеративных процессов головного мозга (нарушение психики из-за повреждения головного мозга, вызванного старением или перенесенными заболеваниями).

- Последствия цереброваскулярной недостаточности (нарушений мозгового кровообращения) или первичные и вторичные когнитивные нарушения (нарушения работы головного мозга) у пожилых, характеризующиеся нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением концентрации внимания.

- Нарушение поведения и аффективной сферы (расстройства настроения) в старческом возрасте: эмоциональная лабильность (неустойчивость настроения), повышенная

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.07.2026 № 13289
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0011)

раздражительность, снижение интереса, старческая псевдомеланхолия (подавленное настроение у престарелых людей).

- Мультиинфарктная деменция (ухудшение работы мозга после нескольких перенесенных инсультов).

Способ действия препарата Глиатилин

Препарат Глиатилин содержит холина альфосцерат, который в организме превращается в глицерофосфат и холин. Глицерофосфат является предшественником фосфолипидов и участвует в синтезе фосфатидилхолина (мембранного фосфолипида), который улучшает эластичность мембран и функцию рецепторов. Холин участвует в биосинтезе ацетилхолина – одного из основных медиаторов нервного возбуждения. Благодаря этим компонентам Глиатилин усиливает метаболические процессы и активирует специфические структуры головного мозга.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Глиатилин

Противопоказания

Не принимайте препарат Глиатилин:

- если у Вас аллергия на холина альфосцерат или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы беременны или кормите грудью (см. раздел Беременность, грудное вскармливание и фертильность);
- если Ваш возраст до 18 лет.

Если что-либо из этого относится к Вам, сообщите об этом своему врачу, так как Глиатилин Вам не подходит.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Глиатилин проконсультируйтесь с лечащим врачом. Сообщите врачу, если во время лечения препаратом Глиатилин у Вас возникнет **тошнота.** Тошнота может являться следствием допаминергической активации (стимулирующего влияния препарата на систему мозга, активность которой регулируется дофамином).

Дети и подростки

Не применяйте препарат Глиатилин у детей в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность у детей до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Другие препараты и препарат Глиатилин

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Клинически значимого взаимодействия препарата Глиатилин с другими лекарственными средствами не установлено.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

<u>Беременность</u>

Глиатилин противопоказан во время беременности. Не применяйте препарат Глиатилин во время беременности.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.07.2026 № 13289
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0011)

Грудное вскармливание

Глиатилин противопоказан в период грудного вскармливания. Не применяйте препарат Глиатилин в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и при занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата Глиатилин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

По 1000 мг (4 мл) 1 раз в сутки.

При необходимости лечащий врач может принять решение об увеличении дозы.

При появлении сомнений в отношении применения лекарственного препарата Глиатилин посоветуйтесь с лечащим врачом.

Путь и способ введения

Внутривенно (капельно) или внутримышечно (медленно).

При внутривенном введении содержимое одной ампулы (4 мл) разводят в 50 мл 0,9 % раствора натрия хлорида, скорость инфузии 60-80 капель в минуту.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения обычно составляет 10 дней. При необходимости лечение можно продолжить по назначению врача в зависимости от клинической картины и особенностей течения заболевания, возраста и переносимости препарата.

После стабилизации состояния больного возможно продолжение лечения пероральными лекарственными формами препарата.

Если Вы приняли препарата Глиатилин больше, чем следовало

В случае передозировки возможно возникновение тошноты и других побочных эффектов. Обратитесь за медицинской помощью. Врач назначит Вам лечение для устранения симптомов передозировки (симптоматическая терапия).

Если Вы забыли применить препарат Глиатилин

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата Глиатилин

Обратитесь за консультацией к своему лечащему врачу, если Вы хотите прекратить лечение как можно раньше. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Глиатилин может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех. Препарат хорошо переносится даже при длительном применении.

Прекратите применение препарата Глиатилин и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения у Вас любой из следующих нежелательных реакций,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.07.2026 № 13289
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0011)

частота возникновения которых неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- кратковременная спутанность сознания;
- тошнота;
- боль в животе.

При появлении перечисленных нежелательных реакций может потребоваться уменьшение дозы препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не указанные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1
Телефон: +7 800-550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Адрес в интернете: www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Армения
ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»
Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5
Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05
Электронная почта: vigilance@pharm.am
Адрес в интернете: www.pharm.am

Республика Беларусь
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а
Телефон: +375 (17) 242 00 29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Адрес в интернете: www.rceth.by

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, 13
Телефон: +7 (7172) 235-135
Электронная почта: farm@dari.kz
Адрес в интернете: www.ndda.kz

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики
Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25
Телефон: 0800 800-26-26

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.07.2026 № 13289
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0011)

Электронная почта: pharm@dlsmi.kg
Адрес в интернете: www.dlsmi.kg

5. Хранение препарата Глиатилин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и ампуле после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или вместе с бытовыми отходами.

Нет особых требований к утилизации.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Глиатилин содержит

Действующим веществом является холина альфосцерат.

Каждый мл раствора содержит 250 мг холина альфосцерата.

1 ампула с 4 мл раствора для внутривенного и внутримышечного введения содержит 1000 мг холина альфосцерата.

Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является: вода для инъекций.

Внешний вид препарата Глиатилин и содержимое упаковки

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Препарат представляет собой прозрачный бесцветный раствор для внутривенного и внутримышечного введения.

По 4 мл в ампулы нейтрального бесцветного стекла, тип I. По 3 ампулы в контурной ячейковой упаковке из полимерного материала. По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

По 4 мл в ампулы нейтрального бесцветного стекла, тип I. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке из полимерного материала. По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

По 4 мл в ампулы нейтрального бесцветного стекла, тип I. По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке из полимерного материала. По 2 контурных ячейковых упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Италия
Италфармако С.п.А.
Вьяле Фульвио Тести, 330 - 20126 Милан
Телефон: +39 02 64431
Электронная почта: info@italfarmacogroup.com

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.07.2026 № 13289
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0011)

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
ООО «ИТФ»
Адрес: г. Москва, 115114, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, ком. 56
Телефон: +7 (495) 933-14-58
Электронная почта: safety-ru@italfarmaco.ru

Республика Армения
Частный предприниматель Артак Геворкян
Адрес: г. Ереван, Кентрон 0002, ул. Павстоса Бузанда, 97, кв.96
Телефон: +374 91 204155
Электронная почта: artakovich@yahoo.com

Республика Беларусь ООО ФармАссистенс
Адрес: г. Минск, 220131, 4-й переулок Кольцова, 51, 4 этаж, офис 54
Телефон: +375 (17) 3171923, +375 (29) 6404286
Электронная почта: pv@pharmassistance.by

Республика Казахстан и Кыргызская Республика
Представительство МЕДЭКСПОРТ Италия в Казахстане,
Адрес: г. Алматы, 050059, Микрорайон Самал-2, дом 105
Телефон: +7 727 308 05 90
Электронная почта: officealmaty@gmail.com

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC.

<--->
(линия отрыва или отреза)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 06.07.2026 № 13289
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0011)

Следующие сведения предназначены исключительно для медицинских работников:

Рекомендуемая доза

По 1 ампуле (1000 мг) в сутки. Дозировка и длительность лечения зависят от клинической картины и особенностей течения заболевания, возраста и переносимости препарата и устанавливаются врачом индивидуально.

Способ приготовления

Для приготовления раствора для внутривенного введения содержимое одной ампулы (4 мл) разводят в 50 мл 0,9 % раствора натрия хлорида.

Путь и способ введения

Внутривенно (капельно) или внутримышечно (медленно). Скорость инфузии при в/в введении 60-80 капель в минуту.

Несовместимость

В связи с отсутствием исследований совместимости, данный лекарственный препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности при применении

Тошнота может являться следствием допаминергической активации.

Передозировка

Симптомы: тошнота.

Возможно усиление выраженности дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическая терапия. Эффективность диализа не установлена.